

10號 衛教單

硝化甘油 (NTG, Nitroglycerin) -耐絞寧舌下錠 正確使用須知




●作用：

耐絞寧舌下錠具有血管擴張作用，可用於預防或緩解心絞痛的急性症狀（如胸痛、胸悶或呼吸困難等）。



●使用方法：

1. 當心絞痛症狀發生時（如胸痛、胸悶或呼吸困難等），請先採坐姿，置一粒耐絞寧舌下錠於舌下



置於舌下

2. 若用藥（第一顆）5分鐘後症狀仍未緩解，再服用一顆（第二顆），若症狀仍未緩解，請應立即至急診就醫（請勿自行開車）。在就醫途中，可再服用第三顆，最多含3顆，並於就醫時告知醫師已使用過耐絞寧舌下錠。



●注意事項

1. 隨時攜帶藥片(NTG)，避免攜帶時靠近身體溫度太高的部位，例如不要放置於褲子口袋內，但可放置上衣口袋內
2. 遵從醫師指示服藥控制及按時返院追蹤。
3. 注意藥物應置於原容器內(暗色瓶子內避光)，並將瓶蓋蓋緊，儲存於乾燥室溫環境中，開瓶後可保存6個月。(開瓶時請記的在瓶子上註明開瓶日期)
4. 當胸痛發作時，立刻置一藥片於舌下，最好坐下，防止血管擴張導致低血壓、頭暈等副作用，以避免發生跌倒。
5. 可能出現的副作用：頭痛、臉色潮紅、低血壓、眩暈、心搏過速等。
6. 請勿與Cialis(犀利士)、Levitra(樂威壯)或Viagra(威而剛)併用