


13號 衛教單

Trulicity(易週糖) 正確使用須知



如何使用此藥？

1. 注射筆請存放在冰箱。
2. 如果無法冷藏，注射筆在室溫下(<30°C)可放置14天。
3. 注射筆包含玻璃的部分，如果掉落，請換一支新的注射筆。
4. 藥物可以注射在腹部或大腿，或由別人協助注射在您上臂後側。



5. 可以每週注射在身體相同部位，但不要剛好注射在同一個點上。
6. 醫護專業人員會協助您選擇最適合的注射部位。


如果錯過一劑該怎麼辦？

1. 如果距離下次用藥時間還有3天(72小時)以上，請立即注射。
2. 如果距離下次用藥時間不到三天(72小時)，請跳過這一劑。
3. 兩劑Trulicity(易週糖)之間至少要隔3整天以上。


臺北榮民總醫院新竹分院 藥劑科
-藥物諮詢電話(03)5962134轉502-

Trulicity(易週糖)使用步驟：


1. 打開蓋子：
請確認注射筆**已上鎖**。
(1)拉開灰色蓋子，把蓋子丟掉。灰色蓋子不可以蓋回注射筆，以免損壞針頭。
(2)不要碰觸針頭。



2. 放置並解鎖：
(1)將透明底座平貼緊壓乾淨皮膚。然後轉動鎖定環**解鎖**。
(2)注射筆一定要緊壓皮膚，再解鎖。
(3)如果太早按下注射按鈕，可能浪費掉一劑藥物。



3. 按住不放：
(1)按住綠色按鈕不放；會聽到清楚卡嗒聲。
(2)繼續將注射筆緊壓皮膚，直到聽到第二聲卡嗒聲。
(3)可能需要5到10秒鐘。
(4)將注射筆拿開



當看到灰色活塞，表示您已正確完成注射。