

# 4號 衛教單


## 易利達乾粉吸入劑 Relvar 潤娃 Trelegy 肺樂喜

### 正確使用須知




臺北榮民總醫院新竹分院 藥劑科  
-藥物諮詢電話(03)5962134轉502-

### 藥盒內容物




### 如何正確操作?


1. 撕開封蓋來打開藥盒。




2. 盒中有1包乾燥劑，切勿吞食或吸食。將這包乾燥劑丟棄於垃圾桶中。




3. 全新的吸入器含有30劑，當每次打開吸口蓋時，計數便會減1。




4. 將吸口蓋頂下滑到底並暴露吸口，會聽到「咔嗒」聲，計數便會減1，毋需震搖。




5. 盡量呼氣，切勿將氣吹入吸口。




6. 將吸口放在雙唇之間，閉上雙唇緊含吸口，雙唇應該要吻合吸口處弧度。




7. 以穩定的方式深吸一口氣，請勿由鼻子吸入，切勿讓手指蓋著通氣孔。




8. 將吸入器自口中移開，盡可能憋氣至少3-4秒，或在舒適的前提下盡量閉氣。



9. 慢慢輕輕地呼氣，如果沒有感覺到或嚐到藥物，這是正常的，切勿吸入另一劑量。



10. 關上吸口蓋之前，可使用乾面紙清潔吸口。將吸口蓋向上滑動，直到蓋住整個吸口。



11. 當吸入器只剩下小於10劑的劑量，計數器的左邊會呈現紅色。當最後一劑藥物使用完後，計數器會顯數字0，代表吸入器已經空了。

