

7號 衛教單

鼻噴劑

Avamys & Azetin

正確使用須知



● 使用方法

(一) 第一次用藥



第一次用藥前，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次(5-10次)，以確保噴出藥霧量均一(如圖所示)。



若到下次使用前的時間超過24小時，使用前請再重複上述動作，惟只需對空噴壓一次即可。

(一) 平常用藥



1. 擤鼻



2. 搖動藥瓶



3. 移動瓶蓋



4. 以圖示姿勢握住藥瓶



5. 用拇指壓住一邊鼻孔，將噴頭插入鼻孔，頭稍向前傾，開始用鼻吸氣。吸氣時用手按壓噴嘴，使之噴出指定劑量的氣霧。



6. 用口呼氣；如需第二噴，請重複步驟5、6，吸入第二次噴劑。



7. 換手，並在另一邊鼻孔重複整個程序。

注意事項：

1. 使用時不要超過醫師指示之劑量和次數，以避免增加副作用。
2. 鼻腔有黴菌或病毒感染者，需事先主動告知醫師。
3. 本藥不可和眼睛接觸，若不慎接觸到眼睛，請立即以水沖洗。
4. 按壓時需用力、快速往下壓，如此噴出的藥物劑量才會完全。