

暈得寧貼片使用注意事項

一、性狀

暈得寧 (Scopolamine 1.5mg) 貼片，為一面積為 3cm² 之圓形經皮吸收貼片劑 (Transdermal Drug Delivery System)，使用時貼於耳後皮膚。其主成分以三天釋出 1.0mg 的速率持續釋出，經皮膚吸收，進入血液，以達到鎮暈止吐之藥效。

二、主成分：每片含 1.5mg 東莨菪鹼 (Scopolamine)。

三、適應症

1. 預防或緩解動暈症 (暈車、暈船) 所引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀，
2. 減輕唾液分泌多無法吞嚥及瀕死前之喉音 (Death rattle) 等症狀。

四、用法用量

1. 使用時先由切口處撕開鋁箔包裝，取出暈得寧貼片劑，撕去透明塑膠護膜 (請勿觸及貼片劑之銀色內面)，將銀色內面貼於耳後無毛髮並已洗淨拭乾之完整皮膚表面；
2. 藥效約 4-6 小時生效，每片藥效可維持 72 小時，72 小時後另一耳後方再貼一片新的貼片。

五、副作用

貼片的副作用相當輕微，如嗜睡、倦怠感等，約 40% 的使用者有口乾的感覺；偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應 (以幼年及老年人較常見)。

六、注意事項

1. 須置於小孩接觸不到之處；
2. 貼上或去除後務必洗手；除去貼片後請將該部位清洗乾淨。
3. 避免陽光直射，宜保存於陰涼處；
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用；
5. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

七、警語

1. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，請不要使用此藥；
2. 12 歲以下不建議使用；
3. 本品不可與酒精性飲料同時使用；
4. 使用本藥後，勿駕車或操作危險機械；
5. 本品使用前後應徹底清洗雙手及所貼部位。